RED DE SALUD Canas Canchis Espinar

**DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO**
**U.E. 401 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR**
**ESTADISTICA E INFORMATICA Y TELECOMUNICACION**
**MONITOREO DE MICRONUTRIENTES**

| PERIODO | |
|---|---|
| AÑO | MES |
| 2023 | ABR - JUN |

**RED DE SALUD:** 04 - CANAS-CANCHIS-ESPINAR **MICRO RED:** 0400 - NO PERTENECE A NINGUNA MICR **ESTABLECIMINETO:** 000007135 - ESPINAR

**EJECUTORA:** 09 - HOSPITAL ESPINAR **PROVINCIA:** **DISTRITO:**

## I. ADMINISTRACION PREVENTIVA

### A) Multimicronutriente (en polvo)

| ACTIVIDADES | DOSIS 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | TA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 11 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | **0** |
| 1 Año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2 Años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| 3 Años | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **8** |
| 4 Años | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** |

### B) VITAMINA A

| DOSIS 1º | 2º |
|---|---|
| 34 | 0 |
| 24 | 24 |
| 10 | 13 |
| 19 | 13 |
| 10 | 7 |

### A.1. Sulfato Ferroso

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 -5 M | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | **0** |
| 6 - 11 M | 44 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | **113** |
| 1 Año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | **0** |
| 2 Años | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | **17** |
| 3 Años | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **18** |
| 4 Años | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **13** |

### A.2. Polimaltosado

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M - 5M - (TA) | 46 | 0 | | | | | | | | | | | 49 | **46** |
| >=6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | **1** |
| 1 Año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | **0** |
| 2 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | **0** |
| 3 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **0** |
| 4 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **0** |

## I. ADMINISTRACION TERAPEUTICA

### A.1. Polimaltosado / A.2. Sulfato Ferroso

| | A.1. 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total | A.2. 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <= 11 M | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 1 Año | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 29 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 31 | 1 |
| 2 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 Años | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |

### A.3. SUPLEMENTACION PREVENTIVA CON HIERRO A GESTANTES / A.3. SUPLEMENTACION TERAPEUTICO CON HIERRO A GESTANTES

| | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puerpera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina A "G - P" | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| TA | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | 0 |

### C) DOSAJE / D) DIAGNOSTICO

| EDAD | DOSAJE DE HEMOGLOBINA Blanco | 1er | 2do | 3er | 4to | 5to | 6to | TOTAL | DIAGNOSTICO DE ANEMIA Tipo LEV | MOD | SEV | Total | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-28D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 -11M | 0 | 63 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 1A | 0 | 38 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1 |
| 2A | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3A | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4a | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5-9a | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | | | | C.1. Anemia en Puerpera | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | C.1. Anemia en Gestantes | | | | | | | | |
| **TOTAL** | **0** | **191** | **50** | **0** | **1** | **0** | **0** | **242** | **12** | **15** | **0** | **27** | **1** |

### E) Control

| Control de dosaje a pacientes con Anemia 1er | 2do | 3er | total |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 3 | 6 |
| 0 | 11 | 14 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 1 | 2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **0** | **17** | **19** | **36** |

### F) VISITAS

| EDAD | ANEMIA | MMN Total | 1ras | 2das |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### VISITAS PREVENTIVAS

| EDAD | Total | MNM | SULFATO | LEMONITOR | LEORIENTAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 M | | 0 | 51 | 0 | 0 |
| 5 M | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 |
| 6 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 M | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5-9a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **52** | **0** | **49** | **0** | **3** |

### VISITAS ANEMIAS

| EDAD | Total | SULFATO | ELEMONITOR | TELEORIENT |
|---|---|---|---|---|
| 1-28D | | | | |
| 6-8 M | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9-11 M | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| **TOTAL** | **6** | **6** | **0** | **0** |

..... .....

12/07/2023