

DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORMATICA Y TELECOMUNICACION
INFORME MENSUAL ESTRATEGIA SANITARIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - PLANIFICACION FAMILIAR

RED DE SALUD (ALL) MICRO RED (ALL)
 ESTABLECIMIENTO (ALL)

PROVINCIA (ALL)
 DISTRITO (ALL)

AÑO 2023
 MES INI 7 A FIN 9

I. ATENCION PRENATAL REENFOCADA

| GRUPO ETARIO | GESTANTES | | | | | | PAP | | Gestante con batería completa en I-TRIM del Emb. | Gest 1ra batería | Gest 2ra batería | VBG | | Ecografía | | | Tamizaje de Bacteriuria | | Tamizaje de Proteiniuria | | Gestante con atención Prenatal reenfocada | VACUNAS GESTANTES | | | | ATENCION ODONTOLOGICA | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|----------|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|----------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|----------|--------------------------|----------|---|-------------------|----------|----------------------|-----------|-----------------------|----------|---------|
| | ATENDIDA | | | | | ATC | CTRL | TOMA DE MUESTRA | | | | RESULTADO POSIT. | TAMIZAJE | DETECCION | 1º Ecografía | 2º Ecografía | 2º Ecografía | Cant. | POSITIVO | Cant. | | POSITIVO | DTPA | Proteggidas 2º dosis | HVB | INFLU | 1era ATC | 2da ATC |
| | Total | I TRIM | II TRIM | III TRIM | ATC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 12 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12-17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | | |
| 18-29 | 26 | 20 | 4 | 2 | 214 | 26 | 4 | 0 | 20 | 26 | 11 | 26 | 0 | 43 | 27 | 39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 4 | 0 | 15 | 4 | | |
| 30-59 | 19 | 13 | 6 | 0 | 112 | 17 | 1 | 0 | 13 | 19 | 8 | 19 | 0 | 24 | 22 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | | |
| TOTAL | 47 | 34 | 11 | 2 | 346 | 47 | 5 | 0 | 34 | 47 | 21 | 47 | 1 | 71 | 53 | 73 | 47 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12 | 6 | 0 | 27 | 6 | | |

| GRUPO ETARIO | EVAL. BIENESTAR FETAL | | PSICOPROFILAXIS | | ESTIMULACIÓN PRENATAL | |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | 1º PROC | 2º PROC | ATD | PREPARADA | 1º SESIÓN | 2º SESIÓN |
| | | | | | | |
| < 12 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-17 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 18-29 | 47 | 57 | 21 | 7 | 20 | 25 |
| 30-59 | 24 | 31 | 14 | 6 | 10 | 7 |
| TOTAL | 79 | 92 | 39 | 13 | 34 | 35 |

| GRUPO ETARIO | GESTANTE | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|--------------------|------------|-----------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | ANEMIA | | | MANEJO TERAPÉUTICO | | DOSAJE DE HEMOGLOBINA | | PLAN DE PARTO | | | |
| | LEVE | MODERADA | SEVERA | RECUPERADA | 1º ENTREGA | 6º ENTREGA | 1º DOSAJE | 1º ENTREVISTA | 2º ENTREVISTA | 3º ENTREVISTA | EFFECTIVO |
| < 12 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 18-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 28 | 13 | 13 |
| 30-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 10 | 12 | 10 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 47 | 42 | 28 | 25 |

ADMINISTRACIÓN CON MICRONUTRIENTES

| GRUPO ETAREO | ADMINISTRACIÓN SULFATO FERROSO | | | SUPLEM. CON ÁCIDO FÓLICO | | SUPLEM. CALCIO | |
|--------------|--------------------------------|-------------------|--|--------------------------|----------|----------------|-----------|
| | ATD | GEST SUPLEMENTADA | PROTE-GIDA (210 tab) puerpera 10-59 años | 1RA | 2DA | 1RA | 5TA |
| < 12 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18-29 | 12 | 29 | 22 | 22 | 0 | 12 | 30 |
| 30-59 | 5 | 11 | 15 | 15 | 0 | 8 | 13 |
| Total | 18 | 42 | 37 | 38 | 0 | 20 | 45 |

VII. ATENCION DE PUERPERIO

| GRUPO ETAREO | ATD | CTRL. | Complificada | Vitamina A |
|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| < 12 a. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-17 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18-29 | 14 | 22 | 2 | 0 |
| 30-59 | 10 | 15 | 4 | 0 |
| TOTAL | 26 | 37 | 7 | 0 |

IX. VISITA DOMICILIARIA

| | VISITAS | ATD | ATC |
|----------|---------|-----|-----|
| Gestante | 44 | 88 | |
| Puérpera | 3 | 3 | |

ATENCIÓN OBSTETRICA EN LA UCI. (HOSP)

| | |
|---------------------------------|--|
| SHOCK HIPOVOLÉMICO HEMORRÁGICO. | |
| SHOCK SÉPTICO | |
| SÍNDROME HELLP | |
| INSUFICIENCIA RENAL | |
| INSUFICIENCIA HEPÁTICA | |
| INSUFICIENCIA CARDIACA | |
| ECLAMPSIA | |

IV ATENCION DEL PARTO

| ATENCIÓN PARTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | PARTO DOMICILIARIO | | | | PARTO EN EL TRAYECTO | | | | INFORMACION ADICIONAL DEL TOTAL DE PARTOS INSTITUCIONALES Y RECIEN NACIDOS (Nº)* | | | |
|------------------------------|----------|------------|---------|---|---|---|---|-------------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------------|--|----------------|-------------------------------------|--|
| TIPO | VERTICAL | HORIZONTAL | CESAREA | Verificar en aplicativo SEM (egresos hospitalarios) | | | | Quién atiende el parto? | Nro de partos | TOTAL DE RN VIVOS | TOTAL DE RN MUERTOS | Quién atiende el parto? | Nro de partos | TOTAL DE RN VIVOS | TOTAL DE RN MUERTOS | Atención de parto vaginal no complicado | Parto vertical | Atención del parto complicado no Qx | Manejo Activo en la 3era Etapa del Parto |
| | | | | | | | | PERSONAL DE SALUD | 0 | 0 | 0 | PERSONAL DE SALUD | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 86 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FONB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FONP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 86 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

GESTANTE CON COMPLICACIONES

| | |
|--|----|
| HIPEREMESIS GRAVÍDICA. | 1 |
| HEMORRAGIAS DE LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA | 42 |
| HEMORRAGIAS DE LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMÍA | 2 |
| TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO | 0 |
| HEMORRAGIA DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO | 2 |
| TRASTORNOS METABÓLICOS DEL EMBARAZO | 1 |
| INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO | 23 |
| RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS | 2 |
| OTRAS ENFERMEDADES (anemia, tbc, otras) | 33 |
| AMENAZA DE PARTO PREMATURO | 1 |

ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

| | |
|----------------------|---|
| ENDOMETRITIS | 5 |
| MASTITIS | 0 |
| OTRAS COMPLICACIONES | 2 |

XIII. TRANSMISIÓN VERTICAL

| GRUPO ETAREO | GESTANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PUERPERAS INMEDIATAS | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---------|----------|--------------------|---|--------------------------------|----------|--------------------|--------------------|---------|----------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|---------------------------|---------|----------|-------------------------------|--------|----------------------|----------|------------------------------|-------------------|---|--------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| | VIH/SIDA | | | | | SIFILIS | | | | | | | | | | HEPATITIS | | | | | VIH/SIDA | | | SIFILIS | | | | | | |
| | 1er TAMIZAJE CON PRUEBA RAPIDA | | | | Nº de Gestantes con ELISA REACTIVA de PR Reactiva | 2do TAMIZAJE CON PRUEBA RAPIDA | | | 1ERA PRUEBA RAPIDA | | | | 2da PRUEBA RAPIDA | | | 1ER TAMIZAJE CON RPR/VDRL | | | 1º TAMIZAJE CON PRUEBA RAPIDA | | | | Prueba Rápida/ELISA para VIH | Reactivo para VIH | Nº de Puerperas con ELISA REACTIVA de PR Reactiva | Tamizaje RPR | RPR Reactivo | Prueba Rapida | Resultado Positivo | RPR cuantitativo en puerperas con DX Sífilis |
| | I TRIM. | II TRIM | III TRIM | Resultado Reactivo | | II TRIM | III TRIM | Resultado Reactivo | I TRIM | II TRIM | III TRIM | Resultado Positivo | II TRIM | III TRIM | Resultado Positivo | I TRIM | II TRIM | III TRIM | Resultado Reactivo | I TRIM | II TRIM | III TRIM | | | | | | | | |
| < 12 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-29 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-59 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 34 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 34 | 11 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V. MORBILIDAD MATERNA

| | | MORBILIDAD | NRO |
|----------------------------|---|------------------------------|-----|
| Hemorragias | 0 | | |
| HIE | 0 | BAJO PESO | 0 |
| SEPSIS | 0 | PREMATURO | 0 |
| ANEMIA | 1 | HIPOXIA | 0 |
| TBC | 0 | SDR | 0 |
| Retención de Placenta | 2 | SEPSIS NEONATAL | 1 |
| ATENCIÓN OBSTETRICA EN UCI | | SIFILIS CONGENITA | 0 |
| ATENCIÓN OBSTETRICA EN UCI | | RN-VIH expuesto | 0 |
| | | RN CO MALFORMACION CONGENITA | |