



INFORME MENSUAL DE RABIA SILVESTRE

| | | | |
|-----------------|-------|-----------|-----------------------|
| GERESA | CUSCO | PROVINCIA | MINSA |
| RED | | DISTRITO | ESSALUD |
| MICRO RED | | MES | SANIDAD FFAA-PNP |
| ESTABLECIMIENTO | | AÑO | EJECUTORA |
| | | 2023 | 09 - HOSPITAL ESPINAR |

| 1. Indicación de la profilaxis Pre-exposición en Rabia Silvestre | Grupo de riesgo | Total | 0-11a | 12-17a | 18-29a | 30-59a | 60 y más |
|---|---------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|
| En caso se indique la administración de la Vacuna Antirrábica Humana como Pre-exposición: En rabia silvestre sólo se aplicará a las personas que por motivos laborales o de investigación estén en contacto con animales silvestres o ingresen a áreas de alto riesgo a rabia silvestre | Fuerzas Armadas del Perú | - | - | - | - | - | - |
| | Policía Nacional del Perú | - | - | - | - | - | - |
| | Grupo Ocupacional | - | - | - | - | - | - |

| 2. Administración de la Profilaxis Pre-Exposición en Rabia Silvestre: Vacunación Antirrábica Humana | Estado Vacunal | Total | 0-11a | 12-17a | 18-29a | 30-59a | 60 y más |
|---|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|
| TOTAL | | - | - | - | - | - | - |
| Fuerzas Armadas del Perú | ACC: 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SEG: 1 y 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | COB: 1,2 y 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Policía Nacional del Perú | ACC: 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SEG: 1 y 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | COB: 1,2 y 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo Ocupacional | ACC: 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SEG: 1 y 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | COB: 1,2 y 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 3. Profilaxis Post-Exposición en Rabia Silvestre: Manejo de la herida por mordedura | Tipo de exposición | Ind. Tto | Total | 0-11a | 12-17a | 18-29a | 30-59a | 60 y más |
|---|--------------------|----------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|
| TOTAL | SEV | Vac | - | - | - | - | - | - |
| | SEV | RIG Vac | - | - | - | - | - | - |
| Mordedura de Murciélago | SEV | Vac | - | - | - | - | - | - |
| | SEV | RIG Vac | - | - | - | - | - | - |
| Mordedura por otros animales silvestres | SEV | Vac | - | - | - | - | - | - |
| | SEV | RIG Vac | - | - | - | - | - | - |
| Mordedura por otros mamífero domésticos | SEV | Vac | - | - | - | - | - | - |
| | SEV | RIG Vac | - | - | - | - | - | - |

| 4. Profilaxis Post-Exposición en Rabia Silvestre: Vacunación Antirrábica Humana | Situación Vacunal | Frascos RIG | Total Personas | 0-11a | 12-17a | 18-29a | 30-59a | 60 y más |
|--|-------------------|-------------|----------------|-------|--------|--------|--------|----------|
| 4.1 Tratamiento en caso de animal mordedor SILVESTRE EXCEPTO en Cara, cabeza, cuello, genitales, pulpejo de dedos de manos y pies, lesiones desgarradas, profundas o múltiples; y 4.2 Tratamiento en caso de animal mordedor SILVESTRE en Cara, cabeza, cuello, genitales, pulpejo de dedos de manos y pies. | ACCESO: 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | SEGUIMIENTO: 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | SEGUIMIENTO: 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | SEGUIMIENTO: 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | COBERTURA: 5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 Tratamiento en caso de Contacto o Animal confirmado de rabia | ACCESO: 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | SEGUIMIENTO: 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | SEGUIMIENTO: 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | SEGUIMIENTO: 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | COBERTURA: 5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 Tratamiento en caso de Re-exposición | ACCESO: 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | COBERTURA: 2 | - | - | - | - | - | - | - |

| 5. Referencias y Contrarreferencias para el tratamiento antirrábico | Situación Vacunal | Frascos RIG | Total Personas | 0-11a | 12-17a | 18-29a | 30-59a | 60 y más |
|---|-------------------|-------------|----------------|-------|--------|--------|--------|----------|
| DVR Transferencia realizada | ACCESO: 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | SEGUIMIENTO: 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | SEGUIMIENTO: 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | SEGUIMIENTO: 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| | COBERTURA: 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| DVC Transferencia controlada | ACCESO: 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | SEGUIMIENTO: 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | SEGUIMIENTO: 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | SEGUIMIENTO: 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| | COBERTURA: 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| CC Contrarreferencia controlada | ACCESO: 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | SEGUIMIENTO: 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | SEGUIMIENTO: 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | SEGUIMIENTO: 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| | COBERTURA: 5 | - | - | - | - | - | - | - |

| Frascos de Inmunoglobulina Antirrábica para Humanos (RIG) administrados | Total Frascos RIG | 0-11a | 12-17a | 18-29a | 30-59a | 60 y más |
|---|-------------------|-------|--------|--------|--------|----------|
| Total | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 Tratamiento en caso de animal mordedor SILVESTRE en Cara, cabeza, cuello, genitales, pulpejo de dedos de manos y pies, lesiones desgarradas, profundas o múltiples. | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 Tratamiento en caso de Contacto o Animal confirmado de rabia | - | - | - | - | - | - |
| DVR Transferencia realizada | - | - | - | - | - | - |
| DVC Transferencia controlada | - | - | - | - | - | - |

| TOTAL DE DOSIS | Tipo de Biológico | Total | 0-11a | 12-17a | 18-29a | 30-59a | 60 y más |
|----------------|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|
| | VARH PRE (mon) | - | - | - | - | - | - |
| | VARH POS (mon) | - | - | - | - | - | - |
| | RIG (Frascos) | - | - | - | - | - | - |

| 6. Diagnóstico de Rabia Humana Silvestre | Total | 0-11a | 12-17a | 18-29a | 30-59a | 60 y más | Gestante |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|
| | - | - | - | - | - | - | - |

| 7. Vigilancia del reservorio y Diagnóstico | Situación de la muestra | Total |
|---|-------------------------|-------|
| TOTAL | Remitida | - |
| | Procesada | - |
| | Resultado positivo | - |
| | Resultado Negativo | - |
| Muestras de murciélago en vigilancia pasiva | Remitida | 0 |
| | Procesada | 0 |
| | Resultado positivo | 0 |
| | Resultado Negativo | 0 |
| Muestras de otros mamíferos domésticos (equino, porcino, bovino, ovino, etc.) en rabia silvestre, vigilancia pasiva | Remitida | 0 |
| | Procesada | 0 |
| | Resultado positivo | 0 |
| | Resultado Negativo | 0 |
| Muestras de otros animales silvestres | Remitida | 0 |
| | Procesada | 0 |
| | Resultado positivo | 0 |
| | Resultado Negativo | 0 |

| 8. Control Epidemiológico (Control) | Situación del foco | Total |
|--------------------------------------|--------------------|-------|
| Control de foco en vigilancia pasiva | Notificado | 0 |
| | Investigado | 0 |
| | Controlado | 0 |